

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百九十八

詳校官太醫院院使臣張聲基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

晉濟方卷三百九十八

明

周王朱橚撰

嬰兒下痢門

疳痢

附論

夫小兒疳痢者由乳哺不節生冷過度傷於脾胃冷熱相搏致臟腑不調久而不瘥即變諸疳若大腸虛弱水穀不化下痢無度是為疳痢其證面色萎黃肌體羸瘦盜汗壯熱皮毛焦枯嗜好酸醎心腹虛脹痢下蘊瘀日

夜無度是也

方

熊膽散 治一切疳痢

熊膽

研

雄黃

研

青黛

研

丹砂

研各

甘草

炙一

黃礬

去

燒令

細辛

去苗

良姜

荖子

炒各

盧薈

研

龍膽

當歸

去

焙

白礬

燒令

蟬蛻

炒

蝦蟇

炙焦各

麝香

研

黃連

去

黃蘗

去皮各

一兩

右為散六十日至百日孩子每服一字一二歲半錢

三四歲一錢並米飲調下早晚食前各一服

大疳九 治小兒痢疳羸瘦

黃礬

枯

綠礬

各一兩

膽礬

二錢

乾蝦蟆

一枚去腸肚炙

良姜子

葶藶

炒各一分

蝸牛

四枚已上七味入在瓶內鹽泥固濟候乾火燒通赤取出研為

細末

胡黃連

一分

生蝸牛

研三枚

麝香

研

丹砂

研

雄黃

研

牛黃

研各一分

熊膽

研

訶梨勒皮

細辛

去苗葉各二分

青黛

半錢

右為末和令勻燒粟米飯和丸如麻子大每服三九

至五九薄荷湯下不拘時服量兒大小加減

麝香丸 治小兒疳痢不止體瘦食少腹痛羸弱

麝香

細研

硃砂

細研

盧薈

細研

雄黃

細研

母丁香

鶴虱

白礬灰

蜜陀僧

細研

沒藥

龍膽

去蘆頭

地龍

微炒 熊

膽

細研各一分

蟾酥

錢一

艾葉

半兩炒黃

肉豆蔻

半兩去殼

黃連

去鬚

定粉

微炒各半兩

右為末入研了再研令勻以麪糊和丸如菉豆大每服以粥飲下三九日三服量兒大小加減

蘆薈丸

治小兒五疳八痢腹內積滯堅硬如石肚大

筋青面黃羸瘦寒熱往來目澀口臭牙齦爛黑出血

常服長肌退黃殺疳蟲進飲食消積滯

青皮

去穢

陳皮

去白

荊三稜

石三稜

半兩

史君子

檳

榔蓬朮

神麴

炒

麥蘖

各一兩

胡黃連

半兩

熊膽

半兩木香

蘆薈

南星

各半兩

蕪荑

二錢

雷丸

三錢

右為細末麴糊丸如麻子大每服三十丸米湯送下

食前服

熊膽丸 治小兒疳痢氣痢腹大肌瘦常服

熊膽

研

胡黃連

夜明砂

炒

青黛

研

黃連

去鬚各一錢

肉豆蔻

一枚去殼

蘆薈

一分研

龍腦

一錢研

蟾頭

一枚酥炙

麝香

三錢研

史君子

一分去殼

丁香

半分

無食子

一分

右為末粟米飯為丸如菴豆大每服七丸至十九米飲下日三服

青金丹 治小兒驚風諸疳諸痢病疳瘠黃疸喘粗有

氣者或下蟲數合無不即瘥肥壯無疾用之有益

青黛

研三分

雄黃

研

胡黃連

末各二分

丹砂

研

膩粉

熊

膽

溫水化

白附子

為末

蘆薈

研各一兩

麝香

研半兩

蟾酥

水

銀

各皂子大

鉛霜

研

龍腦

研各一錢

右同為末入乳鉢內再研令勻用獾猪膽一枚取汁

熬過浸蒸少許為丸如黃米大暴乾一歲可服二九

量大小增減驚風諸癇先以一九溫水化鼻中令嚏

戴目者當目下瘕癰亦定更用薄荷湯下諸疳米粥

飲下變蒸寒熱薄荷湯下諸瀉痢米飲下疳蚘咬心

棟實煎湯下鼻下赤爛口齒疳蟲口瘡等乳汁研塗
病疳眼雀目白羊子肝一枚竹刀批開內藥肝中以
麻縷纏米泔煮令熟空腹服乳母常忌毒魚大蒜鷄
猪肉治疳最佳

肥兒丸 治小兒五疳八痢陰陽氣不順虛痞腹脹嘔
逆腹痛瀉痢消化乳癖積聚肥退面黃瘦殺蟲安胃
進飲食此藥應有小兒疳病累服藥未效者不問虛
實便與數服即安

檳榔

用麩裏煨熟
去麩剉焙

陳皮

去白

青皮

去白

胡黃連

宣連

去鬚
微炒

白蕪荑

炒

史君子

煨去
皮

肉豆蔻

如檳榔
法煨

人參

去蘆

夜明砂

微炒

赤芍藥

龍膽草

右等分為細末麩糊為丸如蘿蔔子每服三五十丸
同紫蘇木瓜湯下瀉痢米飲下不計時候日二三服
更量兒大小加減

青黛散

治小兒疳痢脊脊如鋸眼口鼻痒自咬指甲

頭髮乾焦下部急痛

青黛

研細

雄黃

硃砂

研俱細

附子

炮製去皮臍

藜蘆

去蘆頭

胡黃連

細辛

麝香

研細

白礬灰

黃礬

莨菪

子

水淘去浮者水煮令芽曝乾炒令微焦已上各一分

右都研令勻每服以粥飲下半錢早晨晚後各一服

量兒大小加減

木香丸

治小兒疳痢日夜不止體瘦乏力不能飲食

木香

蟬殼

微炒去足

肉豆蔻

去殼

黃丹

微炒

硃砂

研細

夜明

沙

微炒各一兩

赤石脂

細研半兩

黃連

半兩微炒去鬚

田父

一校燒灰

蝸

牛二十枚麝香一錢
炒微黃 細研

右羅為細末入研令勻湯浸蒸餅和丸如菉豆大每服以溫粥飲下五九日三服量兒大小加減

厚朴九 治小兒疳痢嘔逆

厚朴

去粗皮薑汁炙三分

龍骨

白石脂

各半兩

白茯苓

去黑皮

人參

各三分

陳橘皮

去白焙一分

當歸

焙三分

肉豆蔻

一枚去殼

烏梅肉

炒

乾木瓜

各半分

右為細末煉蜜為丸如麻子大每服五七丸煎薑棗

湯下食前服

史君子丸 治小兒五疳瀉痢肌膚黃瘦多困好喫泥

土五心常熱煩渴引飲夜多虛汗

史君子

去殼麩
裹煨

木香

無食子

各五
枚

赤芍藥

蘆

薈

研各
一分

肉豆蔻

去
殼

檳榔

煨各
一枚

黃連

去
鬚

麒麟竭

研

麝

香

研各
一分

右為細末粟米飯丸如麻子大每服五丸至十丸米

飲下不拘時服夏秋宜常服

蘭香散 治小兒一切疳痢

蘭香 人糞 白狗糞 蝦蟇 白礬 蜘蛛

蚯蚓

蝸牛子

八味並
燒灰

蘆薈

研

右為散以葶管斜批吹少許入鼻中及齒上更以蜜和塗紙上貼之

蘆薈丸 治小兒疳痢四肢羸瘦腹脹鼻痒皮膚乾燥

下痢不恒

蘆薈

雄黃

各細
研

沒石子

蛇蛻皮

燒灰

丁香

熊

膽

蟬殼

微燒去足

蟾酥

研已上各一分

麝香

黃連

半兩微炙去炒

右為細末煉蜜丸如米大每服以粥飲下三丸別研

一丸吹鼻中量大小加減

龍骨丸

治小兒疳痢日夜無度肌體羸瘦

龍骨

半兩

雄黃

麝香

硃砂

各一錢俱細研

橡實

半兩

蝸牛

二十枚炒微黃

牛黃

細研

白土

青黛

各一錢

訶藜勒

一分煨用皮

右羅為細末入研令勻用麪糊和丸如菉豆大每服

以粥飲下五丸日三服量兒大小加減

龍骨湯 治小兒三歲已上疳痢口瘡身體手脚心熱

龍骨

一兩

黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮炙

地榆

炙各三分

白頭翁

乾

薑

炮

當歸

焙

醋石榴皮

白朮

各半兩

右麤搗篩一二歲每服半錢水半盞薑三片同煎至

三分去滓分溫二服早晚食前各一服量兒大小加

減口瘡取蘆薈赤地利末傅之下部生瘡取蚌蛇膽

黃連麝香等分為末塗傅之一方有高良薑

沉香煎 治小兒疳痢黃瘦焦枯壯熱脹滿

沉香 丁香

酸石榴皮

各二分

木香

肉豆蔻

去殼

訶藜勒

炮去核

無食子

縮砂仁

各三分

史君子

去皮半兩

右為末煉蜜調成膏每服一豆大米飲化下

熊膽丸

治小兒疳痢脾胃虛冷乳食不化臍腹疼痛

熊膽

一分 附子

一枚炮製去皮臍

巴豆

七枚去皮心研紙裏壓去油

定粉

一兩炒 微黃

黃丹

二兩醋炒令紫色

砒霜

一錢細研

乾薑

一分煨裂

硫黃

一錢細研

訶藜勒

一分煨用皮

右為末湯浸蒸餅和丸如黃米大每服以冷水下二

九量兒大小加減切忌熱物

定命丸 治小兒疳痢

青黛

研三分

烏蛇

皮骨酒炙一分

白附子

一枚

乾蠍

炒七分

膩粉

研一分

獨角仙

去足炙一枚

棘剛子

去殼七枚

麝香

研一分

右為末用豬膽汁丸如黍米大每服三丸早晨晚
後各一服溫水下

金髓丸 治小兒急疳痢不止或膿或血或青或黃髮

結或穗或墮落鼻乾咬指好喫土炭

金牙

分一烏頭

生去皮臍半兩

肉豆蔻

去殼一枚

訶梨勒

煨去核二枚

石中黃

如無禹餘糧代

麝香

研

丹砂

研各一分

黃連

搗末用鷄子一枚取

清和未併餅

炙乾一兩

右搗研為末煉蜜九如菴豆大每服五九空心米飲下日晚再服量大小加減

胡黃連九 治小兒氣疳痢下痢腹脹

胡黃連

蝦蟆

炙

蝸牛

研

訶梨勒皮

各半兩

蛇蛻

炙

青黛

研

麝香

各一分

木香

一兩

右為末用米飲為丸如菴豆大每服三五丸米飲下
蟲出為度

至聖丸 治小兒疳痢腹脹肌瘦泄瀉不止

史君子

二十枚
去殼

肉豆蔻

一枚
去殼

丁香

陳麴

炒

雄黃

研

熊膽

研各
一分

麝香

研半
錢

訶藜勒皮

錢一

右為末白麪糊和丸如菴豆大每服十九丸米飲下乳
食前服量兒大小加減

香橘丸 治小兒疳痢冷熱不調水穀不化

史君子

二兩

訶子肉

五錢

神麴

麥芽

甘草

炙

厚朴

各五錢
薑汁炒

陳皮

三錢

木香

二錢半

右為細末煉蜜九米湯化下

水蓼丹 治血痢瘡瘦

蛇蛻皮

燒灰

鷄頭殼

燒灰存性

各一兩

胡黃連

硃砂

水

蓼

各半兩已上搗羅為末次用

蘆薈

牛黃

各一分

粉霜

一錢並各研極

細

右為細末軟飯和丸如黍米大每服五粒至七粒麯

香湯下量大小加減不拘時候

神聖散 治小兒疳痢腹大口乾四肢羸弱下痢不止

乾蝦蟆

一枚五月五日收者去肚腸

獨顆蒜

一顆搗研

川椒

半兩去目已上

二味入蝦蟆腹中用著大麥麴餅裏燒令焦黃色搗羅為末

麝香

一錢龍腦半錢蘆

蒼分硃砂

一錢雄黃二錢

右與前藥同研為散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小加減服之

百中湯 治小兒疳痢

樗皮

炙

黃連

去

積殼

炒

蕪荑

各半

生薑

一分

豉

兩半

葱

白

三莖

右細剉以水五合浸經宿平旦煎取三合量兒大小
空腹服之初服經日昏沉後漸漸甦未全效更作一
劑熱渴與竹瀝飲之

阿膠丸 治小兒一切痢久成疳

阿膠

炙

白龍骨

炙

黃連

去

白石脂

雞屎白

炒

方用

一

雞屎

胡粉

炒

赤茯苓

去黑皮

各一兩

右為細末煉蜜丸如麻子大每服米飲下三丸食前服更量兒大小加減

丹砂丸 治小兒五疳八痢

丹砂

青黛

共研各一分

丁香

半

肉豆蔻

去殼一枚

無食子

一枚麝香

研一錢

乾蝦蟇

去頭足酥塗灸一枚

右為末麪糊丸如黃米大每服三丸空心米飲下

胡黃連丸

治小兒疳痢皮毛焦身體羸瘦喜食酸醎

心腹脹發熱

胡黃連

分一

芩薊

蓬莪茂

煨

青橘皮

去白焙各半兩

乾薑

炮一錢

荊三稜

三錢煨

陳橘皮

去白炒半兩

右為末每抄一錢入巴豆十粒去皮心膜入冷油內

慢火煎墨色研細煮醋麵糊丸如黍米大一歲一丸

薄荷湯下

二肝丹

地膽草

漏蘆

菖蒲

一寸九節煮各一兩

胡黃連

地榆

各半兩已上搗羅為末次用

鷄肝

猪肝

一兩鹽炒少許同上諸藥和煮肝

右為石臼中搗一二百下成膏丸黍米大每服十粒
麝香湯溫下乳食前服量兒大小加減

青黛散 治小兒疳痢下部痒

青黛

蟾灰

各一分

赤石脂

半兩

訶藜勒皮

一兩

胡粉

炒

黃連

去鬚炒

麝香

細研各一分

右搗為散每服以乳汁調下半錢日三四服量兒大

小加減

桃皮散 治小兒疳痢赤白及一切痢并下部濕匿

桃白皮

炙半兩

黃連

去積

胡粉

炒

赤茯苓

去黑皮各一兩一方用白

茯苓黃蘗

去粗皮各半兩

丁香

七粒

右為散每服半錢米飲調下早晚前服量大小加減

豆蔻丸 治小兒疳痢及吐不吃乳食四肢瘦弱

肉豆蔻

去殼一枚

木香

半兩

丹砂

研

人參

訶藜勒

煨去核

麝香

研各一分

右為末用米飲丸如麻子大每服三丸空心米飲下

日再服更量大小加減

龍齒散 治小兒疳痢或口内生瘡

龍齒

兩半

丁香

一分

黃連

去鬚

胡粉

炒

赤茯苓

去黑皮 各半兩

枳

殼

去瓢麩 炒一分

右為散每服半錢粥飲調下食前服量兒大小加減

牛黃一錢亦得有鮮血加蕪荑一分

肉豆蔻丸

肉豆蔻

去殼 一枚

訶藜勒

炮去核 三枚

黃連

去鬚 一錢

赤石脂

研

錢

木香

一枚

蟾頭

薑汁炙 一枚

右為末用蝸牛肉研為丸如黍米大焙乾每服三丸至五丸粥飲下食前服

六神丸 治小兒疳痢羸瘦飲食減少及肚瀉并驟瀉

丁香 木香 肉豆蔻

去殼各半兩三味同麩裏慢火煨

蘆薈研

兩史君子去殼訶藜勒各半兩

右為末棗肉為丸如菉豆大每服三丸至五丸米飲下空心服一方不用棗肉爛飯為丸蓋飯引入脾也驟瀉不已用金星丸等推去滯調理脾胃

黃連木香丸 治小兒疳痢無常色

黃連

去鬚

木香

各半兩

麝香

研一錢

定粉

一分

狗肝

一具切

蝦

募

一枝切

右為末將狗肝蝦募用酒三升煮爛至一升去滓煎成膏丸前末如菉豆大每服三丸空心米飲下更量兒大小加減

葶藶丸 治小兒疳痢面黃體瘦盜汗壯熱心腹虛脹皮毛焦枯

葇若子

醋浸一宿
炒一兩

木香

胡黃連

蘆薈

研各
一錢訶

藜勒皮

二枝

肉豆蔻

大者
一枚

右為末用粟米飯和丸如黃米大每服五丸至十丸

空心米飲下

鼈甲散 治小兒疳氣腹脹泄痢小便赤澀

鼈甲

醋炙去
裙襴

訶藜勒

木香

赤茯苓

去
皮蒼朮

浸焙

一兩牽牛子

炒一
兩半

右為散食前溫水半盞日再服量大小加減

史君子膏 治小兒疳痢腹痛驚瀉清水臟腑虛滑不
思飲食

厚朴

薑汁炙

甘草

炙

訶子

炮各二兩

青黛

陳皮

去白各一分

史君子

半兩用醋
燉爛用

右為末煉蜜為丸如鷄頭大作餅每服一餅用米飲
下一方有青皮無青黛若治下痢青積則用青皮者
是一方兒百日已上三歲每服半丸乳汁化下

香薷丸 治疳痢外由風寒暑濕冷熱不調內因停滯

積聚水穀不化頻下惡物 外證毛乾唇白額青上
絞肚脹腸鳴泄下糟粕

黃連 木香 訶子肉煨 肉豆蔻 縮砂仁 茯苓

苓各二錢

右用飯丸米飲下

療大人小兒久痢成疳方

豉三升 葱白

握 桃葉一握 鹽二十顆

苦參

五寸 青黛一抄

右切以水三升煮取一升二合法仰卧灌下部中極

妙

龍骨湯治小兒痢久成疳漸漸黃瘦

龍骨 訶子肉

炮

赤石脂

各半兩

醋石榴皮

一分炒黃

木

香 史君子

各一分

右為末每服一字至半錢點麝香湯下

玉粉散 定痢截疳

胡粉

一兩半

白龍骨

研

雄黃

研微炒

漏蘆

白馬夜眼

洗淨

楮木根白皮

各半兩

右為細末都拌勻每服一字至半錢以鷄子清調下
乳食前服

青黛丸 治小兒疳痢不止體熱口乾心煩瘦弱

青黛 熊膽 麝香 定粉

炒微黃

寒食蒸餅末

各一

錢蟾酥半錢

右都研如粉用豬膽汁和丸如黃米大每服以粥
飲下五九日三服量兒大小加減

砒霜丸 治小兒疳痢

砒霜

一分
細研

白礬灰

乾蟾

燒灰

夜明沙

微炒

黃丹

微炒
各半

兩

硃砂

一分
細研

右羅為末都研令勻以軟飯和為丸如菴豆大每服以冷水下三十九服藥後以桃柳湯衣服裸之蟲子當出白黃即易瘡黑者難瘡忌食熱物

鉛丹九

治小兒疳痢

鉛丹

炒研

定粉

炒研

蛇蛻

炙焦各
一兩

夜明沙

炒

蘆薈

研臨
時入

各一

分

右為散丹醋拌和為餅就熱銚上煉熟細研為散後入蘆薈和勻每服一字以米飲調服早晨午後各一服量兒大小加減

烏梅丸 治小兒疳痢日夕不止手足逆冷或下鮮血虛渴不止

烏梅肉

炒

龍膽

龍骨

各一兩

黃連

去鬚一兩半

地龍糞

炒一兩一分

右為末煉蜜丸如麻子大一歲米飲下三丸食前服

以瘥為度一方用新汲水服三日隨兒大小加減

厚朴丸 治小兒疳瘦下痢腹脹不思飲食臟腑虛滑

常服化食補胃消疳肥肌

厚朴

去粗皮薑汁炙半兩

陳橘皮

去白焙一分

甘草

炙

史君子

去殼

麩裏

訶藜勒皮

半生半炮各半兩

右為細末煉蜜丸如小鷄頭大三歲已上每服一九

米飲化下百日兒每丸作四服乳汁或清米飲化下

如熱瀉加青黛一兩

神安散 治小兒疳痢煩渴肌體羸瘦

黃耆

蜜炙半兩

甘草

炙二錢

白茯苓

去黑皮

人參

石蓮肉

去心炒各一兩

右為細末每服半兩水半盞棗一枚煎三五沸量兒大小加減溫服

胡黃連丸 治小兒乳哺不節生冷過度下痢不止面黃肌瘦腹脹發熱名曰疳痢

胡黃連 白蕪荑仁

俱為末

蘆薈

研

麝香

研各一分

巴豆

五粒去皮心
膜出油細研

右研勻細煮麪糊和丸如粟米大每服五丸至七丸
柳枝湯下不拘時

治小兒疳痢方

丹砂

研半兩

麝香

研

熊膽

研

丁香

為末

蟾酥

各一錢

右細研如麪取蟾酥和為丸如黍米大一歲一九米
飲或乳汁相和下勿令碎喫藥后以水濃煎桃柳枝
淋洗兒取一九吹兒鼻中以濕青衣覆體其蟲便出

以疾退為度

藥煎丸

治小兒驚疳身熱頰赤發枯皮燥煩滿吐痢

黃蘗

去皮蜜炙

黃連

去鬚

胡黃連

蘆薈

訶藜勒皮

右等分為末熬猪膽汁和丸如黃米大每服十九米

飲下

丁香丸

治小兒疳痢不止漸至困弱

丁香

黃連

去鬚

橡子

白礬灰

各一分

巴豆

七枚以醋漿水

一碗半煮盡為度去皮心研紙裏壓去油

右羅為末以麪糊和丸如黍米大每服以冷粥飲下
三九日三服量兒大小加減服之

麝香丸 治小兒疳痢羸瘦

麝香

一分
細研

鉄粉

半兩

鼈甲

醋炙去
裙襴

黃連

去鬚各
半兩

蝦蟇

去鬚各
半兩

蝦蟇

去鬚各
半兩

蝦蟇

一枝
燒灰

右羅為末以軟飯和丸如麻子大每服以溫米飲下
五九日三服量大小加減

抵聖丸 治小兒疳痢不止漸加黃瘦

巴豆

五枚去皮心研紙裏壓去油

硫黃

錢一粉霜

錢半

硃砂

一分

沒石

子

末一分

右都研如粉用糯米飯和丸如黃米大每服以冷水

下二九量大小加減

砒霜丸

治小兒五疳八痢

砒霜

研一錢

凝水石

燒

附子

炮製去皮臍各一分

定粉

炒半兩

右為末用粟米飯和丸如麻子大每服三九五丸米

飲下量大小加減

青金散 治小兒疳痢

鉛丹 葭若子

胡粉

各半兩

大棗

二十枚

右杵作團燒令通赤取出候冷研細每服半錢空腹米飲調下晚後再服

龍骨散 治小兒疳痢日夜不止肌肉消瘦面黃髮焦啼叫不恒

龍骨

胡粉

炒各一分

黃連

去鬚半兩

白礬

燒令汁盡一分

右為散每服半錢米飲調下空心日三服量兒大小

加減一方用胡黃連

丁香丸

治小兒疳痢日夜無數脫肛身體羸瘦

丁香

三枚

麝香

研少許

青黛

研一分

蝦蟇

一枚

去肚足炙令黃色

右為末煮漿水飲為丸如粟米大溫水下三九量兒

大小加減

肉豆蔻丸

治小兒疳痢不止

肉豆蔻

一枚去殼

胡黃連

一分

砒霜

半分細研

右羅為末用糯米飯和丸如黍米大每服冷水下一

凡切忌熱物

蘆薈丸 治小兒疳痢不止

蘆薈

半兩

定粉

半兩

黃丹

微炒

夜明沙

微炒

各三分

右研為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減服之

硃砂丸 治小兒疳痢四肢乾瘦腹脇脹滿食不能消

硃砂

硫黃

各一分

巴豆

七枚

去皮心研紙裏壓去油

蟾頭灰

錢三

右都研如粉以麪糊和丸如黃米大每服以甘豆湯

下三九量兒大小加減

牛黃丸 治小兒疳痢不止體熱心煩腹痛不能乳食

牛黃

錢一麝香 蟾酥 各半錢

右都研如粉用湯浸蒸餅和丸如黃米大每服空心冷薑醋湯下二九量兒大小加減

麝香丸 治小兒疳痢不止

麝香

研一錢

史君子

去殼半生半炮

無食子

各二枚半生半炮

右為末以薄麪糊丸如小菰豆大每服三九米飲下

和痢丸

一名戊己丸

治小兒疳氣下痢脾受濕氣臍腹刺痛

黃連

去

白芍藥

各半兩

吳茱萸

炒一分

右同炒紫色為末陳倉米飯為丸如黍米大每服三十丸空心米飲下小兒就乳與服一方麴糊為丸

治小兒疳痢肚脹

用薤白一握生搗如泥以粳米粉蜜和作餅炙熱喫
三二服效

治痢成疳

用葶草取蔓節量多少管吹穀道中不過三四瘥神效

療小兒疳痢渴瘵方

一名治小疳痢發渴方

椿木根皮

乾末

粟米

搗粉煮飲汁

右以蜜和作丸服五九至七九十九以瘥為度一方以粟米研煮糊為丸一方以蜜丸如菴豆大每服五九若下部開以乾末頻吹之一方一丸內竹筒中入鼻中三遍瘥服九以飲下

又方

用蝸牛三五十枚於淨盤內以物蓋令行即有似銀泥以膩粉和揩取便丸之如黍米大不計時候以溫水下二丸

又方

一名麝香散

療小兒痢下部開并有瘡疳痢經四五日

吹藥止痢療疳神驗

黃連

三分
搗末麝香
少許
研

右相和以竹筒吹下部中三瘡止

治小兒疳痢

單煮地榆汁如飴糖與服便已又毒蛇螫咬人搗新根汁飲兼薄良久赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升半去滓再煎如稠飴絞濾空腹服三合日再服

治小兒疳痢痔疾

用荒蔚子益母草葉煮食之取汁飲之亦妙

治疳痢腹中諸瘡

用豹皮煮汁飲之或燒灰和酒服之

治小兒疳痢

用飛廉為散以漿水一盞下大效

治小兒疳痢

若行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍飲

又方 治小兒疳痢不止肌體黃瘦宜服

取椿白皮一握倉粳米五十粒葱白一握甘草三寸

灸豉四合以水一升煮取半升頻服之小兒以意服
之一方椿白皮為末麪作丸日乾水煮服加鹽醋亦
可一方臭樗根白皮塗蜜灸焦羅為散每服粥飲調
下半錢一方樗椿白皮葉與皮切用皆同

療小兒疳痢困垂死方

用益母草一握煮汁飲之取足瘥止甚妙

治小兒疳痢

用椿木俗名猪椿可煮汁後灌之

治小兒疳痢不止肌體黃瘦

取橡斗子內仁核煨熟大人嚼爛與兒食之取汁灌之亦佳

治小兒因喫交妳變成疳痢色轉不定宜服此方

用狗骨腐爛者不問多少燒成灰細研為散每服濃煎桃葉湯調下半錢日三服量兒大小加減

又方

取鷄子一枚敲空以巴豆一粒線穿之內入鷄子內

用紙裏以生麪糊定於飯甑內蒸令熟去巴豆每日
喫鷄子一枚至二枚當瀉下惡物即瘥

治小兒疳痢不止宜服此方

用菰苳子四兩淘去浮者水煮令芽出曝乾却炒黑
色搗羅為末以白麪四兩和搜作餅子煉乾搗散每
服以粥飲調下一字空心午後各一服量兒大小加
減

治小兒疳痢肚脹

用鷄子一箇開竅入巴豆一粒去皮膩粉一錢用紙
五十重裏翫上蒸一二度打破取出共研入麝香添
糊為丸如梧桐子大量兒大小加減臨卧服

治小兒疳痢所下之物多黃沫白涕但髮稀面黃腹大
忽非時泄瀉不生肌肉宜喫此方

史君子

蒸三度
半兩

訶子

麪裏煨去
核一兩

白蘼蕒

萆薢

川芎

檳榔

肉豆蔻

木香

各一分

右為細末每服一錢半空心倉米湯調量大小服之

木香丸 治疳痢冷熱不調五色雜下裏急後重

訶子肉

炒一錢

黃連

淨三錢

木香

紫厚朴

去粗皮薑汁炒

夜

明沙

隔紙炒各二錢

右為末粳米飯九麻子大每服十五丸乾艾葉生薑

煎湯食前下

胡粉丸 治小兒疳痢渴不止

胡粉

研半兩

鷄子

一枚

右將鷄子打頭上破如錢眼大入定粉於鷄子殼內

以紙糊定用水一升并入銚子內慢火煮熟取出殼
每服與梧桐子大哺之日三五度量兒大小以意增
減服之

又方

杏仁

一分湯浸去皮尖雙仁

膩粉錢一

右研杏仁如膏加膩粉相和令勻用麪糊和丸如棗
豆大空心以粥飲下三丸

治小兒疳痢及婦人陰瘡

右用鷄卵和光粉炒乾用

治小兒疳痢

以虎膽研水服之

治小兒疳痢痔疾

以益母草葉煮粥食之取汁飲之亦妙

治小兒疳痢

以蚘蛇膽灌鼻中及下部

治疳痢

以鷄子和蠟炒服之

無辜疳痢

附論

夫小兒無辜疳痢者是腦後有核如彈丸捏之皮下轉動者是也若漸長大即隨氣血流散所在停留子母相生侵蝕臟腑肌肉或即生瘡大腸洩痢膿血毛髮皮膚枯槁肌體日漸羸瘦腸胃既虛痢無時節故名無辜疳痢也

方

乾蟾九 治小兒無辜疳痢黃瘦腹痛或腹內有蟲

乾蝦蟆

一枚塗酥
炙微黃

漏蘆 菖蒲

各一兩

雄黃

細研
硃砂

細研各
三分 麝香

細研
一分

右為末都研令勻煉蜜和搗一二百杵丸如菉豆大
每服以粥飲下五九日三服量兒大小加減

無食子九 治小兒無辜疳痢

無食子

煨

甘草

炙

龍骨

當歸

焙

黃連

去
積

人參

各一

兩

右為細末煉蜜丸如麻子大每服三九五丸米飲下
早晨日午各一服以瘥為度

療小兒患無辜疳痢

龍骨 當歸 黃連 人參

各二兩

甘草

炙一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服二九白湯下次日
再服五歲已上五丸若小不能吞丸即研飲之

硃砂散 治小兒無辜疳痢久不瘥漸至羸弱

硃砂

細研

白馬夜眼

微炙

丁香

地榆

微炙各一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三服服後即喫
雉肝粟米粥飲一方無地榆

胡粉散 治小兒無辜疳痢鼻中乾塞眼內有暈黃昏
不見物體熱心煩口乾頂上生瘡

胡粉

錢二

白龍骨

錢二

胡黃連

各為末

三錢

右同炒過後更研令細每服以鷄子清調下半錢日
三四服量大小加減

漏蘆丸 治小兒無辜疳痢羸瘦不欲飲食及腹內蟲

動作多吐清水

漏蘆 猪肝

乾 煨

楮樹根白皮

各一兩

右為末煉蜜和搗一二百杵丸如彈子大每服溫水
研一九不計時量兒大小分減服之

又方

用雉肝一具薄切煉乾為散每服以粥飲調下半錢
日三服每喫藥後宜喫粳米軟飯少許

治小兒無辜腹脹或時瀉痢寒熱不調

用地膽草一兩為散每服一錢以猪肝一兩入鹽少許煮熟不拘時量兒大小分減食之不許輕用

治小兒無辜痢赤白無成疳

用胡粉熟蒸熬令色變以飲服之

煮肝散 治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調

用漏蘆一兩杆為散每服以猪肝一兩散子一錢鹽少許以水煮熟空心頓服量兒大小加減

疳痢久不瘥

附論

夫小兒疳痢久不瘥者因臟腑宿挾疳氣忽乳食不節
冷熱相交腹胃既虛遂令下痢不瘥連滯日月故名久
疳痢也

方

青黛散 治小兒疳痢久不瘥日漸羸瘦

青黛

一兩
細研

麝香

細研

雄黃

細研

硃砂

細研

蚌蛇膽

黃蘗

蜜
苦參

桂心

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麪炒微黃已上各半兩

乾薑

一分
炮製白礬

半兩燒令汁盡

細辛

一分

黃連

半兩微炒去鬚

藜蘆

去蘆頭一

分

附子

半兩炮裂
去皮臍

莨菪子

半兩水淘去浮者煮令
芽出候乾炒令黃黑色

右羅為散都研令勻以甘草水調下半錢日三服一
歲服一字三歲服半錢量大小加減若口有瘡及鼻
痒酥和菴豆大安鼻中若頭疳瘡及下部有瘡赤爛
并用散傳之

黃連散 治小兒疳痢經久不瘥肌膚羸瘦宜服

黃連

微炒

胡黃連

硃砂

研

麝香

細研

蝸牛

微炒各

牛

黃

研

鉛霜

研各

一錢訶藜勒

皮

煨用

沒石子

微

煨史君子

微

肉豆蔻

去殼

定粉

炒微黃

黃丹

微炒

龍骨

各一分

右細羅為散每服粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

當歸散 治小兒久患疳痢

當歸

焙

人參

乾薑

炮

木香

各三分

桃白皮

炙

槐白

皮

炙

丁香

阿膠

炒燥

龍骨

各一分

黃連

去鬚各一兩

麝香

研一分

右搗篩與麝香和勻一二歲每用半錢水一小盞煎

至四分去滓分溫二服更量兒大小加減

硃砂丸 治小兒疳痢久不瘥體瘦羸弱皮毛乾燥髮

無潤澤

硃砂

細研水飛過

青黛

田父灰

牛黃

各半兩

麝香

粉霜

蒼蘆

雄黃

各一分

蛇蛻皮

三尺燒灰

胡黃連

三分

末

虎睛

一雙酒浸蟾酥一宿炙黃

錢一

右為末用軟飯和丸如麻子每服以粥飲下五九日

三服量大小加減

麝香丸 治小兒疳痢久不瘥腹內脹

麝香

一分研

巴豆

去皮心半兩

右先將巴豆入麻油中煎令黑色研爛用紙五重裹出油盡為度與麝香同研勻用稀糊和丸如黍米大每服一九或二九米飲下空心午後各一更量兒大小加減

黃連散 治小兒疳痢久不瘥

黃連

去鬚

白茯苓

去黑皮

阿膠

炒燥

黃蘗

去粗皮

人參

丁

香

各半兩

訶藜勒

三枚炮去核

桃白皮

炙三分

無食子

無乳者二

枚

右為散每服半錢米飲調下空心午近晚各一服更

量兒大小加減

雄黃丸 治小兒疳痢經年不止進退不定狀如白膠

雄黃

研

凝水石

燒研

白礬

枯研

水膠

丹砂

研各半兩

砒霜

研半錢

鉛丹

研

鷄子皮

燒灰各一分

大黃

炒一兩

右為末和勻以蟾酥麝糊丸如菉豆大每服一九至

二九石榴皮湯下生薑湯新汲水亦得早晚食前各一更量兒大小加減

丁香散 治小兒疳痢久不瘥

丁香 訶藜勒皮 當歸 焙各半兩 龍骨 煨 蘆薈 研三分

麝香 研 胡黃連 各一分 肉豆蔻 去殼一枚

右為散每服半錢米飲調下早晨午後各一量兒大小加減

五靈脂散 治小兒宿挾疳氣因乳食不節腸胃虛損

下痢日久

五靈脂 赤箭 龍骨各一分 麝香研 丁香 蘆薈

研各半錢 熊膽研 胡黃連各一錢

右為細散每服半錢陳米調下

夜明沙丸 治小兒疳痢久不瘥不喫乳食漸加黃瘦

夜明沙一分 訶藜勒微炒 龍骨煨用皮各半兩 熊膽細研 硃砂

細研 牛黃細研 麝香細研各一分 黃連半兩微炒去鬚

右為末都研令勻以猪膽汁和丸如黍米大每服以

粥飲下五九日再服

獐猪膽丸 治小兒疳痢久不瘥食物即嘔

獐猪膽

瓦上煨乾二兩

胡椒

乾薑

炒

蕪荑

炒

陳橘皮

白去

焙各一分 蒔蘿

微炒半兩

蒼朮

炒三分

右為末用稀糊和丸如麻子大每服五九米飲下早晚各一服量大小加減

龍膽丸 治小兒疳痢久不瘥體熱心煩不欲乳食

龍膽

一分去蘆頭

史君子

胡黃連

苦楝根皮

炙微黃各

兩麝香半 蟾酥一分 臭樗根皮半兩炒

右為末都研令勻以麪糊和丸如菉豆大一歲以粥飲下一丸兒稍大以意加之

蟬蛻丸 治小兒疳痢或青或黃項細腹大口鼻生瘡

日加羸瘦久不瘥

蟬蛻去足 麝香研各一分 青黛研 阿膠炙燥各半兩 蛇蛻皮

一條 燒灰 瓜蒂七枚

右為末稀糊和丸如菉豆大五歲以下每服三丸或

五九米飲下空心日午近晚各一服更量兒大小加減

天靈丹 治疳痢久不瘥四肢羸瘦或多心忪驚悸

乾蟾

一兩燒灰一方用人糞

天靈蓋

一箇燒灰

莨菪子

半兩水淘去浮者炒

令黑

胡黃連

半兩末

砒霜

一分同天靈蓋濕紙三五重裹膠泥固濟於木灰火

上燒令通赤取出候冷以上都搗細末次入

麝香

一分

右件都拌勻軟飯和入黍米大每服五粒乳汁下量兒大小加減服之不計時節孩子昏昏似醉以衣蓋

覆候睡覺看兩手十指節頭有毛白者立瘥赤者五
日內瘥青黑者難瘥

蝸牛散 治小兒疳痢不瘥肌體黃瘦愛食泥土

蝸牛

二十枚

蛇蛻皮

一分

葦荍子

半兩水淘去浮者

乾蜩螗

半兩

臭黃

夜明沙

各一分

右都入甕瓶子內以泥封瓶口燒令藥熟候冷取出
搗羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大
小加減

訶梨勒散

一名龍骨散

治小兒疳痢久不瘥

訶梨勒

炮去核

龍骨

赤石脂

蜜陀僧

煨

酸石榴

皮

焙

麝香

各一分

右為散每服半錢米飲調下空心食前服若是膿血痢黃連湯調下量兒大小加減

黃連散

治小兒疳痢久不瘥并暴痢

黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮各三分

桃白皮

炙

胡粉

各半兩炒黃

丁香

沉香

各二分

木香

各二分

川椒

分

右為散每服半錢米飲調下空心午後各一量兒大小加減

丹粉散 治疳痢久不瘥肌膚羸瘦

黃丹

微炒

胡連

炒黃各一兩

醋石榴皮

三分微炒

訶藜勒

一兩煨用

皮棗

二十枚去皮燒灰

右搗為散每服煎糙米粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減服之

蟬殼丸 治小兒疳痢久不瘥日夜度數無恒

蟬殼

去足
微炒

蝸牛殼

乾漆

搗碎炒令煙
出各一分

狗頭灰

三分

夜明沙

一分
微炒

右為末湯浸蒸餅和丸如菉豆大一歲以粥飲下一
丸兒大小即隨年加之

砒霜丸

治小兒疳痢久不瘥宜服

砒霜

雄黃

硃砂

麝香

乾蟾灰

已上各
一分

右同研為末湯浸蒸餅和丸如黍米大每服以冷粥
飲下一丸日再服忌熱物

救急散 治小兒疳痢久不瘥

丁香

二十七粒一方用母丁香

鷄屎礬

燒灰

麝香

研各一分

黃蘗

去粗皮一

兩

右為散和勻每服半錢早晨米飲調下相繼煮苜蓿并勿令熱與喫極效更量兒大小加減

蕪荑丸 治小兒疳痢久不瘥

蕪荑

炒為末半兩

羊子肝

一枚

右先用米泔煮羊肝令熱切作薄片將蕪荑末糝在

肝內搗爛更入少糯米糊和丸麻子大每服五丸米
飲下早晚前各一服量兒大小加減

胡粉散 治小兒久痢無間冷熱痢水穀痢日夜不
止

胡粉

研三分

棗

七枚去核用
入胡粉在內

右搗為餅煨赤取出以碗合之候冷細研為散每服
半錢米飲調下空心午後各一更量兒大小加減

蘆薈丸 治小兒疳痢久不瘥肚大有青筋漸瘦

蘆薈

粉霜

各一兩

右同研為末以水煎黃連汁至濃和丸如菉豆大每服食前以粥飲下五九量兒大小加減

然疳丸

治小兒疳痢久不止

雄黃

研

麝香

研

牛黃

研

蘆薈

研

硃砂

細研

胡黃連

蜜陀僧

燒令赤色研

龍骨

燒令赤色已上各一分

青黛

半兩研

金箔

十片
研

肉豆蔻

二枚
去殼

蟾酥

半分
熱水化如泥

右羅為末入研了藥及蟾酥研令勻湯浸蒸餅和丸

如黃米大每服溫水下三九煎黃連苦參湯洗身上
用青衣蓋出蟲後便瘥

暖腸丸 治痢久瀉不止臟腑冷熱

木香 肉豆蔻 丁香 胡椒

右等分為末蒸餅為丸如棗豆大每服三五丸用米
飲下

痢痢腹脹

附論

夫小兒痢者由痢多而腸胃虛弱冷氣在內與臟氣

相搏真邪交擊故令腹中疝痛

方

附子散 治小兒疳痢多有白膿腹內疝痛

附子

一枝炮製
去皮臍

龍骨

細研

赤石脂

細研各
半兩

蜜陀僧

細研

黃丹

微炒

烏賊魚

燒灰

赤芍藥

已上各
一分

棗

五枚
燒灰

訶梨勒

一分煨
用皮

炭皮

一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

木香丸 治小兒疳痢腹脹疔痛

木香 附子

生用去皮
臍各半兩

巴豆

半分去皮心
研紙裏去油蟾酥
半分

研

青橘皮

去白
焙

肉豆蔻

去殼各
半兩

硃砂

研細

人參

去蘆
頭各

分一

右為末用醋煮麪糊為丸如粟米大每服粥飲下二
九量兒大小加減

草豆蔻散 治小兒疳痢腹痛不下乳食

草豆蔻

三分
去皮

龍骨

一兩
醋

石榴皮

三分
炒黃

高良薑

一分
剉

當歸

微炒
半兩

乾薑

一分
炮

子芩

三分

右為散每服一錢水一小盞入薤白一莖煎至五分
去滓不計時量兒大小分減溫服

白朮散

治小兒疳痢腹脹疔痛日夜三十行

白朮

一兩
微炒

當歸

微炒

地榆

炒

木香

赤芍藥

甘草

炙各

半兩

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計
時量兒大小分減溫服

胡黃連丸 治小兒疳痢腹痛不止

胡黃連

半兩

沒藥

木香

各一分

右羅為末用糯米飲和丸如菉豆大每服以粥飲下
五九日三四服量大小加減

疳痢下部濕蠱

附論

夫小兒乳食不節冷熱相乖傷於臟致疳氣也若脾胃
虛弱則哺乳不消大腸虛寒遂變洩痢因其久痢不止
腸胃俱虛為水濕所乘腹內蟲動侵蝕下部故名疳痢

濕蠱也

方

黃丹丸 治小兒疳痢不止下部濕蠱宜下蟲即自止

黃丹 定粉

蛇蛻皮

燒

蟬殼

各一分

青州棗

四十枚

去核乾蟾一枚醋小半燒灰

右都搗為團以炭火燒令煙盡取末搗羅極細入麝香末一分更同研令勻以麪糊和丸如菉豆大每服以溫水下五丸為散即服一字良久當有蟲出黑者

難治

如聖丹 治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部疳痢濕蠱

乾蟾

七枚
燒灰

蟬殼

半兩

蛇膽

一分

大棗

一分
去核燒灰
已上搗羅為末

黃丹

定粉

麝香

各一分
並細研

右同拌勻用好醋一大盞擣一二百下成膏丸黍米
大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加減或化三
兩粒塗患處若蟲出即愈

麝香丸 治小兒疳痢下部濕蠱

麝香

錢一 蝦蟆

半兩 燒灰

砒霜

分一

蟬殼

燒灰

蝸牛

燒灰

蛇蛻皮

燒灰各

半兩

右同研為末用軟飲和丸如粟米大每服以冷粥飲下三九量兒大小加減

桃白散 治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部疳痢濕蠱

桃木白皮

黃蘗

寢灸

黃連

去鬚炒各一兩

蛇蛻皮

半兩 燒灰

乾

蝸牛

一分 燒灰

青州棗

五十枚去核燒灰

右為細末入定粉麝香一分同研勻每服一字粥飲

下乳食前服

治小兒疳痢久不斷體羸昏昏不睡下部濕墮食飲不下方

用蚺蛇膽如大豆許大煮木通汁研膽以意多少用粥飲調服早晨晚後各一服並塗五心及下部

蠱毒痢 附論

夫小兒下痢瘀血如鷄鴨肝片隨痢而下者蠱毒痢也皆由歲時寒暑不調有毒厲之氣中兒腸胃其邪與血

氣相搏變而成痢血毒氣盛熱則傷損腑臟如中蠱之
狀故名蠱毒痢

方

黃連飲 治小兒蠱毒痢下血體羸并熱毒痢

黃連

去鬚
一兩

犀角

鎔

白蘘荷根

黃芩

去黑
心

茜根

各三
分

敗鼓皮

焦炒

藍青

甘草

炙

白頭翁

去蘆頭
各半兩

右搗篩一二百日兒每半錢水半盞煎至三分去滓

分溫二服更量兒大小加減一方無敗鼓皮

白頭翁散 治小兒歲時寒暑不調而有毒厲之氣入

於腸間其痢狀如鷄鴨肝片隨痢而下乃名蠱毒痢

及肛門脫出去毒止痢

白頭翁

黃連

去鬚微炒

茜根

焙乾

蘇枋木

舊鼓皮

炙令

黃焦各

一兩

犀角屑

地榆

炙各半兩

甘草

炙一分

右為細末每服一錢水一小盞煎六分去滓溫服量

兒大小加減乳食前服

升麻散

一名義荷散

治小兒蠱毒血痢身體壯熱煩悶

升麻

白藜荷根

各一兩

犀角

鎊

芍藥

各三分

敗鼓皮

炙焦一分

乾藍

甘草

炙各半兩

右搗篩一二歲每用半錢水半盞入豉七粒煎至三

分去滓分溫二服空心午後各一更量兒大小加減

地榆丹 消毒止痢

地榆

炙

黃連

乾藍葉

川升麻

各一兩

川楝子

苦楝根

各半兩

右為細末軟飯和丸如黍米大每服十粒米飲下量

兒大小加減乳食前服

犀角散 治小兒蠱毒血痢發甚心神煩悶腹脹不欲飲食

犀角屑 白蘘荷根 地榆炒 桔梗 蘇枋木分三

右為散每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服不拘時量兒分減服一方無蘇枋木

犀角地榆湯 治小兒蠱毒血痢并熱不瘥

犀角鎊 地脉草各一分 地榆三分

右搗篩一二歲每服半錢水一小盞入蜜半匙煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加減

犀角飲 治小兒蠱毒痢下血不止身體壯熱

犀角

鎊

地脉草

各一兩

右搗篩一二歲每服一錢水一盞煎五分去滓分溫二服更量兒大小加減一方為散以粥飲調下半錢

治小兒洞泄注下

附論

夫小兒下痢不止食已即泄名為洞泄注下此由風邪

客於腸胃所致蓋方春之時為風冷所傷藏在肌肉至
長夏陰氣方盛或因飲食居處不慎復被風冷入於腸
胃其病下痢冷盛則重故為洞泄注下病本於風若甚
則變胃風證

方

黃芩湯 治小兒洞泄下注壯熱兼渴增損

黃芩

去黑心

枳殼

去穰麤炒

桂皮

甘草

炙

女萎

黃蘗

去粗皮炙
各一兩

石膏

碎

栝蒌根

竹葉

各半兩

赤茯苓

去皮

一兩
三分

右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓分溫二服空
心晚後各一更量兒大小加減

葛根湯 治小兒春夏秋冬晨夕暴冷折其四肢熱不
得泄發為壯熱冷氣入胃洞泄下痢或赤白頻數小
腹脹痛脉洪大或數者

葛根 黃芩 去黑心 芍藥 白朮 藁本 甘草 炙各

一
分 赤茯苓 去皮 大黃 炙半兩

右搗篩一歲已下每一錢水七分煎至五分去滓分
溫三服食前日三服量兒大小加減

大安丸 治小兒脾胃冷氣洞泄注下腹痛嘔逆腸鳴
脹滿大便青白

木香 訶藜勒皮 人參 白茯苓 去黑皮 各半兩 陳橘

皮 去白 焙 厚朴 去粗皮 薑汁炙 白朮 烏藥 各一兩

右為細末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸溫米飲化下
歲數小者半丸

草豆蔻湯 治小兒洞泄不止

草豆蔻

三枚 去皮

高良薑

人參

甘草

乾木瓜

各一

分

白茯苓

去皮

桔梗

炒各半兩

右搗篩每一錢水七分生薑二片同煎至四分溫三

服乳食前各一量大小加減

木香豆蔻丸

治小兒泄痢不止進食和氣

木香 草豆蔻

去皮

檳榔

陳橘皮

去白焙

青橘皮

去白

各一

荊三稜

煨搗碎四兩

肉豆蔻

去殼五枚

右為末麪糊丸如小豆大每服五丸至七丸棗湯下
更量兒大小加減

石脂丸 治小兒洞泄

白石脂 厚朴

去粗皮
薑汁炙

當歸

炒各
一兩

乾薑

炮

赤石脂

煨

訶藜勒皮

陳橘皮

去白焙
半兩

右為細末飯丸如梧子大每服五丸空腹服米飲下
訶藜勒丸 治小兒洞泄注下腹脹不思乳食

訶梨勒皮

二錢
炮

青橘皮

去白
焙

乾薑

各一
分炮

白豆蔻

去
皮

木香

烏頭

炮去
皮臍

葶藶

各一
錢

右為細末煮棗肉和丸如葶豆大每服七丸米飲下

不拘時量兒大小加減

健胃散

治小兒泄瀉身熱煩渴

厚朴

去皮薑
汁炙

川黃連

肉豆蔻

各一
兩

縮砂仁

乾

薑

白朮

木香

各半
兩

右為末每服一錢水一小盞生薑粟米各少許煎五

分去滓溫服

人參茯苓湯 治小兒洞泄不調

人參

赤茯苓

去皮各一兩半

枳殼

去穰麩炒

甘草

炙各一兩

黃芩

去黑心

桂皮

二兩半梁州者佳

右搗篩一二歲每服一錢水五分煎至三分去滓分溫二服空心午後各一兒大者增之

草節丸 治小兒洞泄不調

無食子

肉豆蔻

去殼各一枚

吳茱萸

湯洗焙乾炒

乾薑

炮

黃連

去鬚炒

訶藜勒

炮去核各一錢

右為細末湯浸蒸餅心和丸如菜豆大每服五丸甘草
節湯下乳食前服更量大小加減

粟煎湯 治腸胃受風冷泄注不止身體壯熱

白朮

當歸

焙

川芎

人參

去蘆頭

肉桂

芍藥

右為細末每服一錢水一盞生薑三片粟一匙頭煎
五分去滓溫服

訶梨豆蔻丸

治小兒久泄不止

訶梨勒

草豆蔻

各一兩

白朮

乾薑

川黃連

當歸

各半
兩焙

右為細末米飯和丸如黍米大每服十粒米飲下大

小加減

阿膠丹 治痢泄身熱及暴瀉不住

真阿膠

炙燥

乾薑

各一兩

芍藥

當歸

焙

黃連

肉豆

寇

各半分

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒粟米飲下

量兒大小加減

訶子湯 治小兒泄痢

訶子

去核

人參

去蘆頭

木香

白茯苓

各一兩

甘草

炙

陳

橘皮

去白各半兩

右為細末每服一錢生薑二片煎至五分去滓溫服
香橘丸 治小兒洞泄心腹脹痛不思飲食

陳橘皮

去白焙三兩

丁香

訶藜勒皮

甘草

炙

青橘

皮

去白焙各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服一丸生薑湯化下

三歲以上二九

小連九 治小兒腸胃虛寒洞泄下痢腹痛

黃連

去鬚炒
半兩

吳茱萸

湯浸
焙乾

乾薑

炮各
一分

肉豆蔻

去殼
二枚

草豆蔻

去殼
一枚

右為末燒粟米飯和丸如菉豆大每服七丸乳食前

米飲下更量大小加減

厚朴散 治小兒洞泄注下

訶梨勒

炮

厚朴

薑汁
製

肉豆蔻

各一
兩

白朮

乾薑

各
半

兩

右為細末每服一錢水八分生薑粟米各少許煎至五分去滓溫服

清胃散 治挾熱泄痢頻併

川楝子 黃柏

炙

地榆

炙

當歸

焙

黃連

炒各半兩

右為細末每服一錢水八分煎至四分去滓食前溫服

豆蔻丸 治小兒洞泄不止

草豆蔻

三枚
去皮

烏頭

三枚用鹽花
水浸少時炒

益智

去皮

青橘皮

去白

焙各

一分

右為末生薑汁煮麪糊丸如菉豆大每服七丸煎木瓜湯或生薑湯下乳食前服更量兒大小加減

附子丸

治小兒洞泄及冷痢日夜數十行

附子

炮製去皮
臍一枚

訶梨勒皮

一枚

白礬

三分燒
令汁盡

甘草

炙半

兩

右為末飯丸如梧桐子大每服三九至五九空腹米

飲研下日三四服量大小加減

香礬丹 治小兒泄瀉久不瘥

白礬

枯

木香

各一兩

訶子

炮

酸石榴皮

炒黑各半兩

右為細末煉蜜丸如黍米大每服十粒粥飲下量兒大小加減

蜜院僧散 治小兒洞泄下痢不止漸至羸困

蜜院僧

黃丹

定粉

白礬

各一兩研

右以新甕瓶盛用紙筋泥固濟以文火燒令通赤候

冷取出入龍骨末一兩同研令細每服以粥飲調下
半錢日三四服量兒大小加減

四物梁米湯 治少小泄注

梁米 稻米 黍米

各三升 蠟如彈丸大

右以水五升東向竈煮梁米三沸去滓復以汁煮稻
米三沸去滓更以汁煮黍米三沸去滓以蠟內汁中
和之消取以飲之有驗

乾薑丸 治小兒洞泄晝夜不止

乾薑炮人參

黃芩

去黑心
各半兩

右為末煉蜜丸如菉豆大每服三丸米飲下空心日
午晚後各一量大小加減

三聖散 治小兒洞泄下痢羸瘦及赤白臍腹撮痛日
夜頻併煩渴全不入食

地榆

半兩
微炙

厚朴

三分去粗
皮薑汁炙

訶藜勒

半兩
用皮

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大
小臨時加減一方用木瓜棗湯下

加聖散 治小兒洞泄下痢不瘥乳食全少

鹿茸

半兩去毛塗酥炙微黃

黃連

三分去積微炒

厚朴

半兩去粗皮生薑汁炙香

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

又方

楮樹葉

半兩

訶黎勒

一分煨用皮

橡實

七枚微炒

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

藜蘆散 治少小泄注痢方

藜蘆

一分

黃連

三分

附子

一分

右為細末蜜丸如麻子大以粥飲服二丸立效

厚朴湯 治小兒泄痢不止

厚朴

去粗皮
薑汁炙

黃連

去鬚各
一兩

右搗篩一二歲每一錢水七分入生薑二片煎至四

分去滓分溫二服空心午後各一更量兒大小加減

沒石子散 治小兒洞泄下痢羸困

沒石子

微煨

訶藜勒

煨用皮各半兩

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小

加減

羊脰灰散

一名鹿角散

治小兒洞泄下痢不瘥乳食全少

羊脰骨

燒灰

鹿角

燒灰各一兩

右研為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以熱水化下

三九日三四服量兒大小加減

梅花丸

治小兒泄痢不定肚疼霍亂

白石脂

煨

川乾薑

炮等分

右為末白糊丸小豆大每服三十九米湯下

治小兒洞泄下痢

用煮柏葉服之

治小兒洞泄下痢并赤白痢

用燒蝦蟇灰米飲調方寸匕服五月五日者尤佳

治少小洞注下痢方

用蒺藜子二升搗汁溫服以瘥為度

又方

用狗頭骨燒灰水和服之一方細研為散以粥飲調
下半錢日三四服大小加減

又方

炒倉米飲服

又方

炒豉令焦水淋汁服之神驗冷則酒淋服一方用五
月五日百草末吹下部

石蓮散

用石蓮肉乾為末陳米飲下便覺思食仍以日曬東方壁土炒陳皮加薑棗煎一方治下痢并嘔噦不食用石蓮去心為末米飲下治噤口痢因濕藥太過傷胃聞食口開四肢逆冷若穀道黃汁長流不治

烏鷄煎

以烏骨鷄一隻去毛腸用茴香良薑紅豆陳皮白薑椒鹽同煮熟爛以鷄令患者嗅之使聞香氣如欲食

令飲食汁肉即使胃氣開病愈人活亦可治久痢

治少小洞注下痢

用木瓜汁飲之

斗門丸 治小兒腸胃虛弱泄瀉糟粕或便白淋晝夜無度

附子

一枝重六兩

硫黃

肉桂

龍骨

訶子

丁香

乾薑

各一分

右件為細末煮麪糊丸如黍米大每服三十丸溫米

飲下乳食前空心服

調臟丸 治臟腑不調泄瀉頻併精神昏困全不入食

木香 人參 白朮 乾薑 肉豆蔻 白芍藥

各等分

右件為細末煮麪糊為丸如黍米大每服三十丸乳食前米飲送下

豆蔻丸 治小兒風冷搏於腸胃食泄不止不思乳食

肉豆蔻 草豆蔻 草烏頭

三枚燒
灰存性

右件為細末煮麪糊和丸如黍米大再服十九煎蘿
蔔湯下乳食前空心服

訶子丸 治脾胃不和泄瀉不止

訶子 乾薑 肉豆蔻 木香 赤石脂

各等分

右件為末煮麪糊和丸如黍米大每服三十九空心
溫米飲送下

治小兒洞泄下痢赤白

以羚羊角中骨燒末飲服方寸匕

水穀痢

附論

夫小兒水穀痢者由寒溫失宜乳哺不節或當風解脫血氣俱虛為風冷所傷留連在於肌肉因其脾胃不和大腸虛弱風邪入於腸胃既虛不能制化水穀故變為下痢也

方

神效木香散 治小兒水穀痢腹痛

木香

半兩

訶藜勒

三分煨用皮

龍骨

黃連

去鹽微炒

赤芍藥

微炒
當歸
微炒已上
各一兩

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服
不計時量兒大小加減

梅花丸 治小兒瀉痢不定肚疼霍亂

白石脂
煨
川乾薑
炮等分

右為末白糊丸小豆大每三十丸米湯下

龍骨散 治小兒水穀痢不止

白龍骨 白石脂 黃連
去鬚
微炒
胡粉
炒令黃
各三分
乾薑

半兩
炮裂

右為細散不計時以粥飲調下半錢量兒大小加減

又方

附子

炮去
皮臍

乾薑

炮

橡實

當歸

各半
兩炒

赤石脂

一兩

右為細散不計時以粥飲調下半錢量兒大小加減

地榆散 治小兒水穀痢日夜不止

地榆

炙

厚朴

去粗皮薑汁
炙各三分

黃連

一兩去
驢屎炒

阿膠

半兩
搗碎

炒令
黃色

右為細散不計時以粥飲調下半錢量大小加減

訶藜勒丸

治小兒水穀痢不止羸瘦腹脹不欲飲食

訶藜勒

一兩煨用皮

當歸

一兩微炒

白朮

三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時以粥飲送下七丸量大小加減

又方

白礬

一兩燒令汁盡

訶藜勒

半兩煨用皮

醋石榴皮

三分微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時以粥飲下五丸

量兒大小加減服之

橡子散 治小兒水穀痢日夜畧不暫止

橡實

二兩
微炒

乾柏葉

半兩
微炒

右為細末以水煮烏梅汁調下半錢不計時量兒大小加減

又方

用訶梨勒二兩煨用皮為末煉蜜為丸如麻子大每服以溫水研化五九日三四服大小以意加減

噤口痢

附論

夫噤口痢者久痢脾胃俱虛或峻取太過損傷胃氣致成胃風噤口不食雖曰脾虛亦有熱氣關閉心胸亦使口噤宜用參朮白朮散加石菖蒲枳殼粳米煎之若胸次一開自然乳食得下矣或嘔吐不食者危

方

當歸散 治小兒瀉痢腹痛煩渴不食

當歸 罌粟殼 甘草 地榆 木通 烏梅

陳皮

訶子

炮去核

木香

各三錢

右等分咬咀三歲一錢水半盞煎三分去滓食前服

木薤散

治小兒噤口痢不止或赤白久不止

白朮

半兩

肉豆蔻

炮二枚

木香

二錢

右為末白麪二兩入藥水溲作劑切作條子水煮令

熟用葱白生薑鹽各少許和汁滋味與之看多少仍

兼鷄清九服

香脯

治小兒刮腸下痢噤口不食閉眼合口至重者

精猪肉

一兩薄切
作一片

膩粉

半錢

右將肉於炭火上慢炙旋鋪膩粉令勻炙令成脯每以少許與喫如未知喫嗅於鼻頭自然要喫此方治胃口有毒至奇至妙一方烏骨鷄修事白煮清汁與服胃開痢止人活

治噤口痢

羊骨灰 鹿骨灰

右並水和服之隨得一事即用之

小兒下痢煩渴

附論

夫小兒痢渴不止者此是水穀津液枯竭臟腑乾燥則引飲若小便快痢斷者渴則止若小便不行於小腸胃間虛渴亦不止痢亦不斷凡如此者由身體浮腫脾氣虛弱不能尅水故也亦必腹痛生瘡小兒上焦本熱今下焦又熱氣轉盛熱熏心肺故也

方

天竺黃散 治小兒痢渴不止身體壯熱

天竺黃

研

黃連

去鬚微炒

赤石脂

梔子仁

葛根

各半

兩

甘草

炙一分

牛黃

研一分

樗根皮

炙

黃龍骨

各半兩

犀角

屑

土瓜皮

各一分

右為細散每服以熟蜜水調下半錢日三四服量兒

大小加減

黃芩飲

一名黃芩丸

治小兒下痢兼渴不止壯熱腹痛

黃芩

去黑心

栝蒌根

黃連

去鬚各三分

烏梅肉

一分焙

訶

藜勒

煨去核

樗皮

炙各半兩

當歸

焙三分

石搗篩每一錢水一小盞煎至五分去滓分溫徐徐
令服更看兒大小加減一方為末煉蜜丸如菉豆大
溫粥飲下七九日三四服

黃蘗湯 治小兒大熱痢兼渴

黃蘗

去皮蜜炙半兩

黃芩

去黑心一兩

枳殼

去穰麩炒半兩

石膏

先搗羅為

末一兩

桂皮

一分

竹葉

人參

各半兩

右剉如麻豆一歲每服一錢水七分煎至四分去滓
分溫二服空心午後各一服量兒大小加減

瓜蒌湯 治小兒有熱不調渴痢不止

瓜蒌根

三分

赤茯苓

去黑皮 半兩

黃芩

去黑心 一兩

甘草

半兩

參

二分

黃蘗

去粗皮 炙半兩

右搗篩一二歲每服一錢水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一量兒大小加減

黃耆飲 治小兒渴痢

黃耆

炒

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心 焙

黃芩

去黑心 各三分

高

良薑

炮一分

烏梅肉

焙去核 二枚

白朮

兩半

右搗篩每二錢水八分煎取三分去滓空腹溫服

黃連湯 治小兒渴痢不止壯熱

黃連

去鬚

犀角

屑

甘草

炙

阿膠

炙燥各半兩

烏梅

焙去核

二枚

藍葉

一分

黃芩

去黑心

三分

右搗篩每服三錢水一盞煎取三分去滓空心溫服

知母飲 治小兒下痢虛渴煩熱

知母

焙半兩

瓜蒌根

黃連

去鬚

蘆根

半兩

麥門冬

焙各

去心

焙各

分糯米

合

訶子

錢三

右搗篩每服一錢水六分煎至四分去滓溫服量兒
大小加減

栝蒌湯 治小兒痢不止煩渴引飲

栝蒌根

一兩半

冬瓜

絞汁

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心焙

知

母

焙各三分

粟米

合一

右搗篩一二歲每服一錢水六分煎至四分去滓入

冬瓜汁半合若渴則徐徐飲服隨量大小加減

茆根飲 治小兒熱痢煩渴

茆根

龍骨

白茯苓

去黑皮各三分

人參

半兩

麥門冬

去心

焙三分

厚朴

去粗皮薑汁炙一分

右搗篩每服一錢水一盞煎至七分去滓分作二服

令徐徐溫服量兒大小增減

人參湯 治小兒久痢及腹痛無渴

人參

桔梗

炒各半兩

當歸

焙三分

烏梅

去核焙二枚

艾葉

微炙

黃耆

各半兩

右搗篩一二歲每服一錢水半盞入生薑二片同煎

至三分去滓分溫二服空心午後各一隨兒大小增減

龍骨散 治小兒痢渴體熱煩悶

白龍骨

一兩

茯苓

人參

去蘆頭

各三分

胡黃連

半兩

麥門冬

去心焙

茅根

三分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時量兒大小加減溫服

藍葉散 治小兒痢渴煩熱不止

藍葉一分黃連一分

半兩去
鬚微炒

赤茯苓一分冬瓜半兩

醋石榴皮

半兩
微炒

赤石脂一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入蜜半

茶匙更煎三兩沸不計時量大小加減服之

龍骨散 治小兒痢渴不止身體壯熱

龍骨 甘草

炙

史君子

黃芩

黃連

去鬚
微炒

瓜蒌

根

各半
兩

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

夜明沙散

一名黃金丸

治小兒痢渴不止壯熱腹痛

夜明沙

一分微炒

乾蝦蟆

半兩塗酥炙

蝸牛

三七枚炒黃

麝香

一錢

研

硃砂

一分研

龍骨

半兩

右為細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小臨時加減

當歸散 治小兒痢渴腹內疼痛不止

當歸

三分微炒

黃連

三分微炒去鬚

乾薑

半兩炮

黃耆

三分

甘草

半兩

灸

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時
量大小加減

地龍糞散 治小兒痢渴煩熱不止

地龍糞

人參

去蘆頭

烏梅肉

微炒各半兩

蝸牛殼

炒龍

骨

各一兩

右為麤末每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計
時量兒大小加減

黃連散 治小兒痢渴煩熱喫水不知足

黃連

去鬚
微炒

牡蠣

煨各
半兩

烏梅肉

焙

甘草

炙

訶藜勒

一分

皮 煨用

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

量兒大小加減溫服

桂皮散 治小兒下痢兼渴不止

桂皮

炙一兩

栝蒌根

白茯苓

去黑皮
各三分

人參

半兩

右為散每服半錢粟米飲調下徐徐服之隨大小加

減

人參飲 治小兒夏秋患痢後渴不止變疳

人參 龍骨

地龍糞

各半兩

烏梅肉

七枚焙乾

右搗篩一二歲每服半錢水七分煎至四分去滓分
為二服空心午後各一更隨兒大小增減

桃皮湯 治小兒痢煩渴肘腫頭熱煩悶不欲乳食

桃白皮

黃連

去鬚炒

龍骨

各一兩

丁香

一十四粒一方用木香

右搗篩每三錢水一盞半煎至八分去滓分三服一

方為細散以粳米粥飲調下半錢

蝸牛丸

一名黃金丸

治小兒痢渴不止壯熱腹痛

蝸牛殼

一兩微炒

夜明沙

三分微炒

龍骨

一兩

黃連

三分去鬚微炒

右為末煉蜜丸如梧子大每服以粳米粥飲研化七
九日三四服量兒大小臨時加減

甘草飲 治小兒痢渴不止并冷熱痢心神煩渴腹痛

胃膈滯悶

甘草

炙一分

烏梅肉

焙一分

訶藜勒

焙去核三枚

石搗篩每一錢水一小盞入生薑二片棗一枚同煎至五分去滓徐徐溫服隨兒大小增減一方無棗

地榆散 治小兒痢渴或下五色惡物心神煩熱不止

地榆 白茯苓 黃蘗

微炙各一兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時量兒大小分減服之

楮葉湯 治小兒痢渴不止或時嘔逆不下食

楮樹葉

二十片 微炙

木瓜

半兩

人參

去蘆頭一分

右為末以漿水一中盞煎至六分去滓不計時量兒
大小加減細溫服

訶藜勒煮湯 治小兒痢渴不止腹脹不能食

訶藜勒

煨去核
一兩半

桑葉

二兩
半切

右㕮咀如麻豆每服一錢水一盞煎至五分去滓分
溫徐徐服量兒大小增減

黃耆湯 治小兒久痢煩渴

黃耆 人參

各一兩

右搗篩一二歲每服一錢水一盞煎至五分去滓分
溫二服空心午後各一隨兒大小加減

黑豆飲 治小兒但渴多熱痢不止

黑豆

炒令微
熟半兩

甘草

炙半
兩

右一處用水二盞同煎至一盞去滓分溫五服徐徐
服之

治小兒痢渴小便澀羸瘦宜服此方

用榆樹根白皮一兩炙微黃搗羅為末以粳米飲和

九如菴豆大每服以粥飲下七九日三四服量兒大

小臨時加減

治小兒痢渴不止方立驗

以醋石榴一枚和皮搗用漿水一大盞煎至五分去滓入蜜半合放溫不計時量兒大小加減服之

大艾煎丸 治小兒虛痢作渴不止

大艾葉

燒灰

乾葛粉

炒

海螵蛸

龍齒

胡粉

炒

右等分為末煉蜜丸如鷄頭大每一粒至二粒飯飲

湯磨下

議曰下部既虛無不作瀉瀉之加虛無不成痢瀉痢轉虛故有上盛三焦不順所以瀉若不住則瀉不止痢不渴又以止渴其藥性涼瀉痢尤重此方兩獲全功扶救痢疾不致其虛亦不致熱

烏梅散 治小兒下痢後津液減少臟腑虛躁煩渴引

飲及治諸病煩渴飲無度不止

烏梅肉

微炒
半兩

白茯苓

乾木瓜

各一
兩

右為粗散三歲每服一錢水一小盞入生姜一片煎至五分去滓不計時候量大小加減一方無生薑治小兒渴痢方

用搗冬瓜汁飲之

脫肛

附論

夫肛門者大腸之候若小兒大腸虛冷久痢不已偃氣於下裏急後重或致用力則氣下墜故令肛門脫出是為下痢脫肛之病難經曰出者為虛入者為實楊氏曰

惟實則溫溫則內氣充而有所蓄惟虛則寒寒中肥瘠內
氣之虛實何如耳凡治脫肛先以溫湯洗軟漸漸納入
及小兒啼叫努氣久痢不止風邪襲虛亦有此證

全嬰方云

王伯廣教授子三歲肛腸脫出經旬不入但連聲而哭
自用千金方蠶頭灰散并敷法不放召愚視之先以冷
水淨洗用葶腸散擦於腸頭上以絹帛揉入之從此如
舊又一兒四歲亦脫肛出主人心急以手揉因指甲傷
破流血腫痛狀若紅柿經三日不入召愚視之亦用水
洗以葶腸散頓擦於上至三五日皺而痒脫落黑皮腸
小自然
而入

方

蛇床子散 治小兒脫肛洗藥

蛇床子 藜蘆 槐白皮 苦參 蕪荑仁 白

礬

右為散每用半兩水三升煎取一升密室中洗肛門
一日一度仍傳後方

黃耆散 治小兒脫肛洗後

黃耆

炒三分

附子

去皮臍生用

桑黃

蜜炙熟各一兩

白礬

燒灰半兩

右為散以新綿搥藥傳之更以手按入腸頭

蕪荑丹 治小兒久痢頻併大腸虛冷肛門脫出

白蕪荑

一兩 微炒

鼈甲

一兩 塗酥 炙去裙襴

蝸牛皮

一兩 炙黃

磁石

一兩

椒醋蘸七次 細研水飛

黃連

半兩 去鬚 微炒

蚬蛇膽

半兩

右為細末用軟飯和丸如黍米大每服十粒粥飲下
量兒大小加減乳食前服

蚬蛇膽丸 治小兒痢後腸頭脫出

蚬蛇膽

湯浸軟 一枚

烏梅

焙乾 七枚

蕪荑仁

炒 研黃連

去鬚 一兩

右為細末以蚬蛇膽和搗如硬加煉蜜少許和丸如

麻子大每服三九至五九米飲下日三服更量兒大

小加減

地榆散 治小兒因患瀉痢後脫肛不得收

地榆

炒

乾薑

炮

當歸

焙

縮砂仁

各一分

右為散每服半錢生薑蜜少許和熱酒調下日三服

龜頭散 療小兒久痢脫肛

東壁土

五分

龜頭

一枚炙焦

五色龍骨

五分

卷柏

四分

右搗散以粉傅之按內之即瘥一方無壁土卷柏

鼈頭丸 治小兒積冷久下痢後餘脫肛不瘥腹中冷

肛疼痛不得入

死鼈頭

二枚炙焦一方用鼈頭

小蛻皮

一枚炙今焦

磁石

四兩桂心

三兩

右為末煉蜜丸如大豆大三歲至五歲服五丸至十丸日三服兒大加之粥飲下

妙應散 治小兒久痢大腸虛冷肛門脫出

葶藶子

半兩淘去浮者炒令黑色

天台烏藥

半兩已上搗羅為末次入

白麩

一龍腦半錢

右都拌勻每服一字蜜湯調下乳食前服

龍骨散 治大腸虛弱肛門脫下

龍骨 訶子

炒各一分

沒石子

大者一枚

粟殼

去穰醋炒一錢

右為末白湯調服仍用葱白湯薰洗令軟以手按上
又用新磚一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數
重壓定使磚氣上透不可過熱令病者以臀坐於布
上如覺布溫逐漸減之以腸得溫熱為度一方有赤

石脂用米飲調下

治小兒脫肛

葇荂子

炒

橡實

五枚

蔓陀羅

一枚

右為末乾糝在上以手按入續令嚏噴更不脫下

黃連丸 治小兒久痢腸頭挺出

黃連

一兩去鬚微炒

蚬蛇膽

半兩

蕪荑

一兩微炒

右為末用軟飯和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸
日三四服量兒大小加減

治小兒久痢後大腸頭脫出不進

訶子炮 赤石脂 龍骨各等分

右為末臘茶少許和藥糝腸頭上絹帛揉入甚妙又
治痢米湯送下

黃連丸 治小兒脫肛

黃連去 黃蘗去粗皮炙
各半兩

右為末煉蜜和丸如麻子大每服五丸至七丸早晚
食前米飲下量兒大小加減

鼈頭散 治小兒脫肛

鼈頭

一枚燒
灰存性

葶藶子

炒三分

右為散先以新磚一片燒赤以醋半升潑之候冷熱得所即糝磚上坐之三兩次即瘥一方每空腹以粥飲調下半錢大小加減

二金散 治小兒久痢大腸虛冷肛門脫出

龍骨

一枚活者
兩龜塗酥炙黃

右為細末每用一字至半錢乾貼肛門上按內之一

方用龜頭

瓜蒌丸 治初病脫肛鼻梁青筋唇白齒根焦黃久病
兩頰先赤唇焦多啼哭

黃瓜蒌

一枚白礬半兩

右將白礬入瓜蒌內固濟火煨為末米糊丸每服三
十九米湯送下

五倍子散 治小兒脫肛

五倍子 地榆 訶子

各等分

右為細末每服半錢米飲調下空心服量兒大小加

減

赤石脂散 治小兒因痢後軀氣下推出肛門不入

赤石脂

伏龍肝

各等分

右為細末每服半錢傅腸頭上每日三上用

附子散 治小兒大腸虛冷肛門脫出多因下痢得之

宜以藥傅

附子

生去皮

龍骨

各一兩

右搗羅細散每用一錢傅在肛門上按令入頻用之
以瘡為度

又方

黑狗脊 荊芥

各一兩

右以水二升煎令沸先噓後洗立效

治小兒脫肛久不瘡

雀糞

半兩

乾薑

一分炮

右羅為散每服一錢白麪半匙同搜作餅飪煮熟入

鹽醋少許每日早晨一服量兒大小加減服之

治小兒下痢肛腸下脫久不瘥方

用大蜘蛛濕紙裏燒焦存性入麝香少許同研細先用溫湯淋洗肛邊軟帛搥乾糝藥傅之立效一方治卒脫肛者無麝香更燒桑葉薰

治痢頻脫肛黑色生殼方

用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用真清油點三滴放三角白礬煨過研爛真龍骨少許

同研糝肛頭用芭蕉葉托上勿令使出入令大兒抱
定

治大腸虛肛門出洗方

用香附子荊芥皂角煎水洗

又方

以葱湯洗令軟用芭蕉葉托上

又方

用五倍子朴硝大腹皮煎水洗以赤石脂末糝在芭

蕉葉上托入

貼方

用草麻子四十九粒研爛水調作餅子貼顙頭頂上
收上即洗之

水聖散子 治脫肛不收

用浮萍草末計多少杵為細末乾貼患處

紫葳膏 治臟熱肛門脫出

用紫背葳一大握又以魚腥草搗爛如泥先朴硝水

洗糝肛門用芭蕉葉托入却用藥於臀下貼坐自然致入

抵聖散 治小兒腹中虛痛肛門脫出

用五倍子不計多少為末煉蜜調入如膏攤油紙上貼之托入一方入茶少許糝腸頭上絹帛揉入一方糝患處一物襯手揉入切忌喫發風毒物

治男子婦人小兒脫肛

用乾蝦蟆皮一片瓶中燒煙薰

治小兒因痢肛門脫

以鐵精粉一方磨刀水洗之亦效一方煮水洗之

治小兒五歲以下脫肛

以紫堇草汁半合子許調散和酒令服之亦宜忌食
生冷陳倉米等

又方

一名收
肛散

治小兒脫肛

用團魚頭不拘多少燒灰存性入麝香一錢為細末
糝在肛上一方無麝香用鼈魚頭甲灰取粉撲之

治腸頭作癢即是有蟲

用生艾苦楝根煎湯薰洗

敗毒散 治風邪入大腸脫肛

用敗毒散一貼加陳米煎服或噤口不食加石蓮肉煎

桑葉方

用黃皮桑椹取葉三升煎帶溫以布盛罨小兒肛門輕手按入次用門臼中細塵綿蘸撲之

治脫肛法

用蒲黃一兩猪脂二兩煉和成膏塗腸頭上即縮入

又方 治小兒痢脫肛

用白龍骨末傅肛門腸頭上不過三上瘥

治瀉痢後脫肛

用陳槐花不拘多少為末陳米飲下

治小因痢後軀氣下推出肛門不入方

用細墨末每服以溫酒調下一字日三服

又方

用鼈頭一枚炙令焦為末以米飲調下半錢一方用馬蘭花半兩搗細散以漿水先洗拭乾糝藥末半錢於故綿紙上按入每日用之以瘡為度

又方

用生鐵二觔以水三碗煮取一碗候冷暖得所洗之立瘥

治小兒大腸虛冷脫肛方

用葦管子一兩炒令黑色為末先以暖水淨洗乾拭
塗藥半錢却內入腸不過三上不出便以芸薹子熟
研為末一錢以醋調塗餅上炙乾加減與食之

又方

用女萎五兩燒薰下部三五上瘥

釣腸丸 治脫肛及諸痔下膿不止

白礬 綠礬 訶子 苦瓜萋炒 枳殼炒 白附子

製南星生 鷄冠花炒 附子去皮 半夏 蝟皮破瓶內燒存性

胡桃肉

不油者
燒存性

右各等分為末麪糊丸如麻子大每服二十九空心

送下

又方

用水楊柳根煮水薰洗用馬恰葉托上

木鼈子丸 治小兒久痢腸滑脫肛

沉香

二錢 枳殼 半兩

五靈脂

半兩 微炒

木鼈子

連殼秤半兩去殼用

右件前三味為細末次入木鼈子同研細醋煮麪糊

為丸如黍米大二歲每服三十九醋調茶清送下乳
食前服

龍骨散 小兒久痢脫肛宜服

龍骨 赤石脂 訶子

煨去核

白朮

枳殼

麩炒去穰已上

各等分

右件為細末每服一錢溫米飲調下乳食前服

歸腸散 治小兒腸虛脫肛

橡斗子

半兩蜜炙黃

木賊

半兩燒灰留性


右件為細末每服一錢陳米飲調下乳食前服

治小兒脫肛

先用麻油湯熱薰患處候溫旋洗之即以五倍子細末多糝軟手揉入切忌食發風等毒物又勿令為外風所傷

治小兒脫肛血痢

以槁藤子燒灰服



普濟方卷三百九十八